

**EFEITOS DO USO FOLIAR DE AGROSTEMIN®
EM PLANTAS DE CEBOLA
(*Allium cepa*)**

– observações fenológicas –










SEM AGROSTEMIN

COM AGROSTEMIN



SEM AGROSTEMIN

Raízes escurecidas em toda extensão e brancas somente nas pontas mostram que somente as pontas ainda estão em crescimento.

COM AGROSTEMIN

Raízes brancas em toda extensão mostram que toda raiz ainda está em crescimento.



SEM AGROSTEMIN

COM AGROSTEMIN



SEM AGROSTEMIN

COM AGROSTEMIN

CLASSIFICAÇÃO

O mercado classifica a cebola de acordo com seu tamanho após a colheita, sendo os tamanhos tipo 01 (pequena), tipo 02 (média), tipo 03 (grande) e tipo 04 (muito grande). O preço pago ao produtor é baseado nessa classificação, sendo o tipo 03 o de maior valor de mercado.



TIPO 1
(pequena)

TIPO 2
(média)


TIPO 3
(grande)

TIPO 4
(muito grande)



SEM
AGROSTEMIN

COM
AGROSTEMIN



AGROSTEMIN[®]



Dr. Danilo Gajić

www.agrostemin.com