

AGROSTEMIN



VARIETÀ DI UVA DA TAVOLA E DA VINO,
PORTINNESTI DELLA VITE,

Dr. Danilo Gajic

PRODUZINE DELLE PIANTINE DI VITI

E PIANTAGIONE DI INNESTI ATTECCHITI

APPLICAZIONE: tre volte durante la stagione – applicazione fogliare

- prima v. 10 gg prima della fioritura 450 g/ha di "verde" o 45 g/ha di "aureo"
- seconda v. 10 gg dopo la fioritura 450 g/ha di "verde" o 45 g/ha di "aureo"
- terza v. 10 gg prima invaiatura uva 450 g/ha di "verde" o 45 g/ha di "aureo"

Vite	Modalità di applicazione	Dosi (g/ha)	Tempo di trattamento
Varietà di uva da tavola e da vino	<u>App. fogliare in vegetazione</u>		<u>I spruzzatura</u> 10 gg prima della fioritura
	AGROSTEMIN® – "verde"	3x450	<u>II spruzzatura</u> 10 dopo la fioritura
	AGROSTEMIN® – "aureo"	3x 45*	<u>III spruzzatura</u> 10 gg prima dell'invasatura dell'uva
Portinnesti della vite	<u>App. fogliare in vegetazione</u>		<u>I spruzzatura</u> 10-15 luglio
	AGROSTEMIN® – "verde"	3x450	<u>II spruzzatura</u> 01-05 agosto
	AGROSTEMIN® – "aureo"	3x 45*	<u>III spruzzatura</u> 20-30 agosto
Innesti della vite	<u>App. fogliare sulle barbatelle di vite (luogo di radicazione)</u>		<u>I spruzzatura</u> 10-15 luglio (quando si sviluppano 5-6 foglie sull'innesto)
	AGROSTEMIN® – "verde"	3x450	<u>II spruzzatura</u> 25-30 luglio
	AGROSTEMIN® – "aureo"	3x 45*	<u>III spruzzatura</u> 15-20 agosto
Innesti di vite non attecchiti	<u>Immersione della parte basale dell'innesto</u>	<i>in 10 l di acqua</i>	Prima della stratificazione degli innesti immergerli nella soluzione per 2 – 3 secondi
	AGROSTEMIN® – "verde"	15 g	
	AGROSTEMIN® – "aureo"	1,5 g	
Innesti di vite attecchiti	<u>Trattamento della radice prima della piantagione dell'innesto</u>	<i>in 10 l di acqua</i>	Prima della piantagione immergerli nella soluzione per 2-3 secondi
	AGROSTEMIN® – "zeleni"	15 g	
	AGROSTEMIN® – "zlatni"	1,5 g	

* **AGROSTEMIN® – "aureo"** (concentrato)

Consiglio: Sulle superfici con l'irrigazione goccia a goccia applicare **AGROSTEMIN®** in dosi 1,5 volte maggiori di quelle indicate nella tabella ("**verde**" = 3 x 600 g/ha; "**aureo**" = 3 x 60 g/ha), cioè due volte maggiori ("**verde**" = 3 x 900g/ha; "**aureo**" = 3 x 90g/ha), qualora si volesse aumentare anche la materia colorata della cuticola.

AGROSTEMIN



APPLICAZIONE

Dr. Danica Gajić

- viticoltura -

in vegetazione

- miglioramento delle caratteristiche meccaniche di chicchi e grappoli,
- aumento della massa di chicchi e grappoli,
- aumento dello spessore della cuticola del chicco,
- aumento di resistenza alle temperature basse.

influenza sul rendimento

- aumento del rendimento dell'uva da tavola e da vino per 10-30%,
- aumento della percentuale della I classe di innesti per 10%,
- aumento della massa legnosa, talee di I classe e dei portinnesti per 10%.

QUALITÀ BIOLOGICA

- influenza positiva sull'aumento e rapporto armonioso del contenuto di zucchero e acidi complessivi dell'uva,
- aumento del contenuto di materie colorate, antocianina e carotene, nella cuticola del chicco,
- manutenzione migliore in trasporto e stoccaggio.

Applicazione: di regola **450 g/ha** di "**verde**" (o **45 g/ha** di "**aureo**"), **tre volte** durante la stagione:

Prima volta: app. fogliare, 10 gg prima della fioritura

Seconda volta: app. fogliare, 10 gg dopo la fioritura

Terza volta: app. fogliare, 10 gg prima dell'invasatura dell'uva

Consiglio: in altri termini, contemporaneamente all'applicazione di altri prodotti chimici di protezione, spruzzare con 150 g/ha di "**verde**" (o 15 g/ha di "**aureo**") per il recupero migliore

*È COMPLETAMENTE INNOCUO AGLI ESSERI UMANI, ANIMALI (INCLUSE LE API) E AMBIENTE;
NON RICHIEDE LE MISURE PARTICOLARI DELLA PROTEZIONE IGIENICO-TECNICA *)*

Agrostemin è un'invenzione dell'ad. Danica Gajić. Gli agronomi di numerosi complessi agricoli/ proprietà agricole e gli esperti delle stazioni agricole hanno dato il contributo immenso alla ricerca e alla conferma delle sue caratteristiche con le loro osservazioni e con i risultati-relazioni concrete. Come un prodotto particolare (non è concime, non è pesticida, non è fitormone) dalla vasta gamma di effetti, in base alle ricerche, analisi e verifiche da parte delle istituzioni scientifiche ed esperti eminenti e agli effetti comprovati nella prassi, durante trent'anni di applicazione in agricoltura della Jugoslavia, **AGROSTEMIN®** fa parte dei provvedimenti agro-tecnici standard, come **prodotto per aumento e miglioramento di qualità****.

AGROSTEMIN® viene prodotto secondo il documento del brevetto n. 32749 dell'Istituto federale per i brevetti della SFRJ. Prendendo in considerazione che attualmente sul mercato esistono anche i prodotti falsi, con il controllo della qualità abbiamo assicurato il diritto ad apporre la firma (*Dr. Danica Gajić*) dell'autore-inventore di Agrostemin dr Danica Gajić sulle nostre confezioni e confermare con questo la loro originalità.

*) Decisione n. 3/2-08-9291/02 del 13 gennaio 2003 del Segretariato Federale di lavoro, sanità e previdenza sociale

**) Decisione n. 321-01-01175/2009-11 dell'8 febbraio 2010 del Ministero di agricoltura, silvicoltura e della gestione delle acque della Repubblica di Serbia