

AGROSTEMIN



P O M M E

P O I R E

Dr. Danica Gajić

UTILISATION: trois fois au cours de la saison

- première fois au stade du bourgeon **30 g/ha "or"** ou **300 g/ha "vert"**
- seconde fois avant la floraison **30 g/ha "or"** ou **300 g/ha "vert"**
- troisième fois pendant la cueillette **30 g/ha "or"** ou **300 g/ha "vert"**

Formule		Dosage		Remarque
nom	indication	quand	combien	comment
poudre	WP	au stade du bourgeon – première fois –	3 fois par 30 g "or" ou 300 g "vert" dissous dans l'eau par hectare de verger	diluer 300 g "vert" dans 4 à 5 l ou 30 g "or" dans 1,5 à 2 l d'eau tiède, réparti en le nombre d'arroseurs pour couvrir la surface d'un hectare de fruits
		avant la floraison – seconde fois –		
		pendant la cueillette – troisième fois – (réduit les pertes pendant le stockage)		

Recommandation:

- ❖ s'il y a un intérêt économique, pulvériser même avant l'apparition de la couleur
- ❖ dans les autres périodes, appliquer au même temps que les autres produits de protection en pulvérisant 150 g/ha "vert" (ou 15 g/ha "or") pour une meilleure récupération

plus grande surface
de feuilles avec
plus de chlorophylle

floraison plus luxuriante
et meilleure fructification

couleur variétale
plus prononcée de deux
ou trois teintes

rendement plus élevé de 5 à 14%

augmentation
de la teneur en sucre
et matière sèche

système racinaire
plus long et plus
ramifié

résistance est améliorée
au climat, aux parasites
et aux maladies

plus apte au transport et au stockage

moins de kalò pendant
le transport et
le stockage

meilleure qualité
d'échange de matières
(nutrition)

IL EST TOTALEMENT INOFFENSIF POUR LES HUMAINS, LES ANIMAUX
ET LA PROTECTION TECHNIQUES ET HYGIÉNIQUES*)

Ministère de l'Agriculture et des Forêts de la République de Serbie
Notification n° 321-01-01175/2009-11 du 08.02.2010

*) Notification n° 3/2-08-9291/02 du 13.01.2003. Secrétariat fédéral du travail, la santé et la protection sociale

AGROSTEMIN

UTILISATION

- pomme, poire -

Dr. Danica Gajić

dans le verger

- *résistance améliorée aux nuisibles et aux maladies*
- *feuilles plus brillantes, vert-bleutées (avec plus de chlorophylle)*
- *floraison plus luxuriante et meilleure fructification*
- *meilleure résistance aux conditions climatiques extrêmes: gelées matinales/humidité/sécheresse*

effet sur le fruit

- *couleur variétale plus prononcée de deux ou trois teintes*
- *augmentation de la teneur sucre et matière sèche*
- *plus grande représentation des récoltes de catégorie I*
- *moins de kalò pendant le transport et le stockage*

RENDEMENT PLUS ÉLEVÉ 5 - 14% - AUGMENTE LA QUALITÉ DES FRUITS (plus approprié pour le traitement et le stockage!)

Utilisation: en règle générale **300 g/ha "vert"**(ou **30 g/ha "or"**), **trois fois** au cours de la saison.

Première fois: en phase d'émergence des bourgeons

Seconde fois: pulvériser avant la floraison, en divisant la quantité dissoute de poudre dans une solution d'autres préparations déjà préparées pour un hectare de surface (ne nécessite pas de passage séparé), c'est-à-dire par la quantité d'eau nécessaire **pour pulvériser un hectare**.

Troisième fois: pendant la cueillette – (les fruits sont mieux conservés pendant le stockage)

Recommandation:

- ❖ s'il y a un intérêt économique, pulvériser même avant l'apparition de la couleur
- ❖ dans les autres périodes, appliquer au même temps que les autres produits de protection en pulvérisant 150 g/ha "vert" (ou 15 g/ha "or") pour une meilleure récupération

IL EST TOTALEMENT INOFFENSIF POUR LES HUMAINS, LES ANIMAUX (Y COMPRIS POUR LES ABEILLES) ET L'ENVIRONNEMENT;

*NE NÉCESSITE PAS DE MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION TECHNIQUES ET HYGIÉNIQUES *)*

Agrostemin est l'invention du dr Danica Gajić. Sa contribution incommensurable à la recherche et la confirmation de ses propriétés sont confirmées par les observations et les résultats concrets et rapports des agronomes de nombreuses coopératives/exploitations agricoles et par les experts des stations agricoles. En tant que produit unique (ni un engrais, ni un pesticide, ni une phytohormone), au large spectre d'action, basé sur les recherches, les essais et les vérifications menées par des institutions scientifiques et dont l'efficacité a été démontrée dans la pratique, utilisé depuis trente ans dans l'agriculture yougoslave, **AGROSTEMIN®**, est classé parmi les **mesures agro-techniques standard pour accroître et améliorer la qualité des rendements****.

AGROSTEMIN® est fabriqué conformément au protocole breveté n° 32749, Institut fédéral brevets de la RSFY. Sachant que des copies sont actuellement présentes sur le marché, par contrôle de qualité nous avons sécurisés nos produits en apposant sur l'emballage la signature (*Dr. Danica Gajić*) de l'auteur – inventeur de l'Agrostemin – dr Danica Gajic pour confirmer ainsi leur originalité

*) Notification n° 3/2-08-9291/02 du 13.01.2003. Secrétariat fédéral du travail, la santé et la protection sociale

**) Notification n° 321-01-01175/2009-11 du 08.02.2010 Ministère de l'Agriculture et des Forêts de la République de Serbie