

AGROSTEMIN



Dr. Danilo Gajic

MALINA

ROBIDA

JAGODA

UPORABA: trikrat v sezoni

- prvič v fazi izbruhi popkov 30 g/ha "zlatnega" ali 300 g/ha "zelenega"
- drugič pred cvetanje 30 g/ha "zlatnega" ali 300 g/ha "zelenega"
- tretjič tekom obiranja 30 g/ha "zlatnega" ali 300 g/ha "zelenega"

Formulacija		Odmerjanje		Opomba
ime	oznaka	k d a j	koliko	k a k o
prah	WP	v času izbruhi popkov – prvič –	3–krat na 30 g "zlatnega" ali 300 g "zelenega" raztopljenega v vodi na hektar zemlje s sadje	300 g "zelenega" raztopiti v 4 do 5 l, ozirom 30 g "zlatega" v 1,5 do 2 l tople vode, ki se razdeli na število škropilnic potrebnih za škropljenje 1 ha zasajen s sadje
		pred cvetenjem – drugič –		
		tekom obiranja – tretjič –		

Priporočilo:

- ❖ po obiranju škropiti s 300 g/ha "zelenega" ali 30 g/ha "zlatega" (izboljšuje cvetenje ter uspešnejše oploditev)
- ❖ v ostalih terminih, istočasno s pripravljenimi kemijskimi zaščitnimi sredstvi škropiti s 150 g/ha "zelenega" ali 15 g/ha "zlatega" za bolj uspešno obnovitev.

večja listna površina z več klorofila

bolj obilno cvetenje ter več sadežev

bolj izražena sortna barva, za dve do tri nijanse

veća rodnošć od 5 do 14%

povećana vsebnost sladkorja in suhe snovi

daljše in bolj zrnat koreninski sistem

većja odpornost proti vremenskim razmeram, zajedavcem in boleznim

bolj primerno za transport in shranjevanje

boljša kakovost izmenjava snovi (dohranjevanje)

većja kolićina plodu I klase

POPOLNOMA VAREN ZA LJUDI, ŽIVALI (VKLUČNO S ČEBELAMI) IN NARAVO;
NI PREDPISANIH POSEBNIH UKREPOV ZA VAROVANJA ZDRAVJA *)

Ministerstvo poljedelstva, gozdarstva in voda Republike Srbije
Odločba št 321-01-01175/2009-11 iz dne 08.02.2010.

*) Odločba Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje

