

AGROSTEMIN



Ц В Е Т О В О Д С Т В О

Р О З А

(Rosa L.)

Dr. Danilo Gajić

Производственная база

Из семян

- Способ применения, время и количество
 - ❖ при подготовке к посеву – порошок
 - перед посевом в песок семена перемешать с 30* г/га "золотого"*
 - ❖ уход за сеянцами (превый-второй год) водной суспензией
 - первый раз – 30г/га "золотого" (300 г/га "зеленого")*
после открытия почек
 - второй раз – тем же количеством перед зацветанием*
 - третий раз – в конце сезона (двойная доза)*
 - ❖ пересадки
 - погрузить в водный раствор 1,5г "золотого" (15 г "зеленого")*
на 10 л воды

Прививки (укоренение)

- Способ применения, количество и время
 - привой погрузить в водный раствор 1,5 гр "золотого"*
(15 гр "зеленого") в 10л воды и/или подвой полить
30 гр/га "золотого" (300 г/га "зеленого")

Эффект

- лучшее прорастание и энергия прорастания
- лучшее укоренение – крепкая, необычно развитая корневая система
- пышное кущение
- большое количество крепких, длинных отростки
- пересадка
- лучшая зимовка

* на количество семян, запланированное для засева одного гектара

AGROSTEMIN



Dr. Danilo Gajić

Производство саженцев

Способ применения, время и количество

- ❖ выращивание и пересадка сеянцев/укоренившихся черенков
перед высадкой держать погруженными в рстворе 1,5г "золотого" (15 г "зеленого") на 10 л воды
- ❖ уход за пересаженными сеянцами /укоренившимися черенками
первый раз – после появления почек залить /опрыскать 30 г/га "золотого" (300 г/га "зеленого")
второй раз – перед прививанием привой залить /опрыскать раствором 30 г/га "золотого" (300 г/га "зеленого")
- ❖ прививание
подготовка материала для прививания – держать материал погруженным в растворе 1,5 г "золотого" (15 г "зеленого") на 10 л воды или тряпку, в которой хранятся привои до прививания, смочить указанным раствором
- ❖ уход за привоем–саженцами
после формирования листевой массы на привое, соответственно во время первой подкормки или опрыскивания защитными средствами, полить 30 г/га "золотого" (300 г/га "зеленого")
- ❖ подготовка к пересадке/зимовке
наряду с обычными мерами, которые осуществляются с целью успешной зимовки опрыскать са 60 г/га "золотого" (600 г/га "зеленого")
- ❖ упаковка для перевозки
массу, которой саженцы обеспечиваются влагой во время транспортировки, увлажнить раствором 1,5г "золотого" (15 г "зеленого") на 10 л воды

Эффекты

- успешная пересадка –получение фундамента и саженца
- большой процент принявшихся саженцев
- пышное кущение
- толстые корневые шейки
- большее количество посадочного материала 1 класса
- проще транспортировать и хранить
- лучше зимуют

AGROSTEMIN



Dr. Danilo Gajić

Производство срезанных цветов

Способ применения, время и количество

- сохранение саженцев до момента посадки
 - по получении держать саженцы погруженными в растворе 1,5 г "золотого" (15 г "зеленого") на 10 л воды для восстановления*
- 30 г/га "золотого" (300 г/га "зеленого") залить
 - ❖ когда начнут открываться почки
 - ❖ перед зацветанием, соответственно после сформирования листевой массы
 - ❖ одновременно с подкормкой и внесением защитных средств (половина рекомендованного количества)
 - ❖ перед срезанием цветов
 - ❖ перед концом сезона вегетации (для лучшей зимовки)

Эффекты

- хорошее укоренение
- буйное кущение и цветение
- большее число сильных побегов
- большой процент цветов с длинными и крепкими стеблями
- интенсивный цвет и запах
- лучше переносится транспортировка и хранение
- успешная зимовка

Напоминание: **AGROSTEMIN**[®] совместим со всеми другими средствами, которые применяются в сельском хозяйстве в виде водной суспензии и не требует специального прохода.

Полностью безопасен для людей, животных (включая пчел) и природной среды;
не требует специальных мер НТЗ *)

AGROSTEMIN[®] является инструментом для питания продуктов
на основе растительных экстрактов **)

*) Решение № 3/2–08–9291/02 от 13.01.03 г. Союзного Секретариата по вопросам труда, здравоохранения и социального обеспечения

**) Решение № 321–01–01175/2009–11 от 08.02.2010 г. Министерства сельского, лесного и водного хозяйства Р Сербия