

AGROSTEMIN



CVETLIČARSTVO

Dr. Danilo Gajič

VRTNICA

(*Rosa L.*)

Proizvodna podlog

Iz semen

- Način priprave, čas in količina
 - ❖ pri pripravi za setev – prah
 - pred odlaganjem v pesek, seme pomešati s 30* g/ha **AGROSTEMIN**[®]-a*
 - ❖ nega sejancev (prvo–drugo leto) z vodno raztopino
 - prvič* – 30 g/ha **AGROSTEMIN**[®]-a po odprtju listnih popkov
 - drugič* – ista količina pred cvetenjem
 - tretjič* – ob zaključku sezone (dvojna doza)
 - ❖ ruvanje in presajevanje
 - potopiti v vodno raztopino 1,5g **AGROSTEMIN**[®]-a na 10l vode*

Potaknjenci

- Način priprave, čas in količina
 - potaknjence potopiti v vodno raztopino 1,5g **AGROSTEMIN**[®]-a na 10l vode in/ali prostor predviden za potaknjence zaliti s 30 g/ha **AGROSTEMIN**[®]-a.*

Delovanje

- boljše kaljenje in energija kaljenja
- boljše ukorenjinjanje – močan in razvit koreninski sistem
- bolj bujno izraščanje
- večje število močnih in dolgih koreninskih poganjkov
- večja količina pridelanega materiala I klase
- bolj uspešno prezimovanje

* na količino semena planirano za zasaditev enega hektara

AGROSTEMIN

Proizvodnja sadnic (cepičev)

Dr. Danilo Gajič

Način priprave, čas in količina

- ❖ ruvanje in presajevanje sejancev/potaknjencev
*pred sajenjem držati potopljene v raztopini 1,5g **AGROSTEMIN**[®]-a na 10l vode*
- ❖ nega presajenih sejancev/potaknjencev
 - prvič* – ko se pokažejo listni popki zaliti / poškropiti s 30 g/ha **AGROSTEMIN**[®]-a
 - drugič* – pred cepljenjem podlage zaliti / poškropiti s 30 g/ha **AGROSTEMIN**[®]-a
- ❖ cepljenje
priprava vejic za cepljenje – držati potopljene v raztopini 1,5g **AGROSTEMIN**[®]-a na 10l vode ali krpo v katero so zavite do cepljenja navlažiti z navedeno raztopino
- ❖ nega cepičev–sadik
*ko je formirana listna masa na cepičih, oziroma, v času prvega dohranjevanja ali škropljenja z zaščitnimi sredstvi, zaliti s 30 g/ha **AGROSTEMIN**[®]-a*
- ❖ priprava na ruvanje in presajevanje/prezimovanje
*v sklopu standardnih ukrepov predvidenih za izboljšanje prezimovanja škropiti s 60 g/ha **AGROSTEMIN**[®]-a*
- ❖ pakiranje za transport
*maso s katero se sadikam zagotavlja vlago med transportom navlažiti z raztopino 1,5g **AGROSTEMIN**[®]-a na 10l vode*

Delovanje:

- bolj uspešno presajevanje – prijemanje podlag in sadnic
- večji procent cepičev, ki se primejo
- bolj bujna rast
- večje število močnih izrastkov
- odebeljeni vrat korenine
- večja količina pridelanega materiala I klase
- boljša pripravljenost na transport in shranjevanje
- bolj uspešno prezimovanje

AGROSTEMIN

Dr. Danilo Gajic

Proizvodnja rezanega cvetja

Način priprave, čas in količina

- sprejem in shranjevanje do sajenja
 - po sprejemu, držati potopljene v raztopini 1,5g **AGROSTEMIN**[®]-a na 10l vode z namenom okrepitve*
- s 30 g/ha **AGROSTEMIN**[®]-a zaliti
 - ❖ *ko se pričnejo odpirati listni popki*
 - ❖ *pred cvetenjem, oziroma, po formiranju listne mase*
 - ❖ *istovrstno z dohranjevanjem ali ob tretiranju z zaščitnimi sredstvi (polovica priporočene doze)*
 - ❖ *po rezanju cvetja*
 - ❖ *na koncu vegetativne sezone (boljše prezimovanje)*

Delovanje:

- bolj uspešno ukoreninjanje
- bolj bujna rast in cvetenje
- večje število močnih koreninskih izrastkov
- večji procent cvetov s daljšo in močnejšo držo
- bolj intenzivna barva in vonj
- bolj pripravljeno na transport in shranjevanje
- bolj uspešno prezimovanje

Napomena: **AGROSTEMIN**[®] je kompatibilen s vsemi sredstvi, ki se uporabljajo v poljedelstvu v obliki vodne raztopine – ni potrebno ločeno apliciranje.

Popolnoma varen za ljudi, živali (vključno s čebelami) in naravno okolje;
posebni varovalni ukrepi niso zahtevani*)

AGROSTEMIN[®] je sredstvo za prehrano rastlin na osnovi rastlinskih izvlečkov **)

*) Odločba št. 3/2-08-9291/02 iz 13.01.2003. Saveznog sekretarijata za rad, zdravstvo i socijalno staranje

**) Odločba št. 321-01-01175/2009-1 iz 08.02.2010. Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RSrbije