

AGROSTEMIN



GIRASOLE

Dr. Danilo Gajić

APPLICAZIONE: due volte durante la stagione

- **prima volta** con il seme **30 g/ha "aureo"** o **300 g/ha "verde"**
- **seconda volta** prima della fioritura **300 g/ha "verde"** o **30 g/ha "aureo"** – fogliare

Formulacija		Doziranje		Napomena
naziv	oznaka	kada	koliko	kako
	DS	con il seme (prima volta)	30 g di "aureo" all'unità di semina*) all'ettaro	ručno ili u mešalici za beton, ukoliko se nema prava za zapašivanje semena
prašivo	WP	10 giorni prima della fioritura (seconda volta)	300 g di "verde" o 30 g di "aureo" diluiti in acqua all'ettaro del suolo	mescolare 300 g di " verde " con 4– 5 l, cioè 30 g di " aureo " in 1,5–2 l di acqua calda che viene divisa al numero di spruzzatori necessario per coprire un ettaro coltivato
sospensione acquosa concentrata per il trattamento dei semi	FS, SC	con il seme, insieme ad altri prodotti (prima volta)	0,25 litri all'unità di semina*) all'ettaro	si usa esclusivamente nei centri di lavorazione industriale del seme, alla richiesta**)

Consiglio: in altri termini, contemporaneamente all'applicazione dei prodotti chimici di protezione, spruzzare con 150 g/ha di "**verde**" (o 15 g/ha di "**aureo**") per il migliore recupero

*foglie più grandi
con più clorofilla*

*sistema delle
radici più lungo e
più ramificato*

*dametro più grande
di bulbi - maggior
numero di semi*

**rendimento maggiore da 5 a 20 %
e del contenuto dell'olio**

*energia
di germinazione
migliorata*

*migliora
la resistenza
al clima,
parassiti*

*scambio migliore
delle materie
(alimentazione)*

*periodo più lungo
dalla fioritura alla
maturazione fisiologica
(fioritura precoce)*

**È COMPLETAMENTE INNOCUO AGLI UOMINI, ANIMALI (INCLUSE LE API) E AMBIENTE;
NON SONO PREVISTE LE MISURE PARTICOLARI DELLA PROTEZIONE IGIENICO-TECNICA***)**

Ministero di agricoltura, silvicoltura e della gestione delle acque della Repubblica di Serbia
Decisione n. 321-01-01175/2009-11 dell'8 febbraio 2010

*) quantità progettata di seme della coltura da seminare all'ettaro

**) per i dettagli contattare il distributore – termine di consegna: sette giorni

***) Decisione n. 3/2-08-9291/02 dell'13 gennaio 2003 Segretariato federale di lavoro, sanità e previdenza sociale

AGROSTEMIN



Dr. Danica Gajić

APPLICAZIONE

- girasole -

(come parte di lavori legati alla semina, separatamente o insieme ad prodotti di protezione; nel centro di lavorazione industriale del seme - alla richiesta)

- germinazione più veloce e più uniforme
- radice meglio sviluppata con la maggiore potenza di aspirazione
- piante nello stato migliore,
- aumento della massa fogliare, fioritura precoce, diametro più grande di bulbi, maggior numero di semi
- non influisce l'altezza del gambo
- rendimento maggiore da 5 fino a 10%
- opportuno meglio condizioni climatiche estreme (umidità/siccità)
- maggiore resistenza alle malattie e parassiti
- aumento di contenuto dell'olio con il maggior rendimento complessivo dell'olio grezzo e delle proteine grezze

RENDIMENTO MAGGIORE DA 5 A 10 % - AUMENTA LA QUALITÀ DEL RACCOLTO (aumentato contenuto di olio)

Applicazione: di regola **30 g/ha "aureo"** (o **300 g/ha "verde"**), **due volte** durante la stagione.

Prima volta: o con il seme (in uno stato polveroso), o spruzzare nella fase di 2–6 foglie.

Seconda volta: spruzzare 10 giorni prima della fioritura, dividendo la quantità di polvere alla soluzione già preparata di altri preparati per un ettaro di superficie (non richiede un passaggio separato), cioè alla quantità di acqua necessaria **per la spruzzatura di un ettaro.**

Consiglio: in altri termini, contemporaneamente all'applicazione dei prodotti chimici di protezione, spruzzare con 150 g/ha di **"verde"** (o 15 g/ha di **"aureo"**) per il migliore recupero.

*È COMPLETAMENTE INNOCUO AGLI UOMINI, ANIMALI (INCLUSE LE API) E AMBIENTE;
NON SONO PREVISTE LE MISURE PARTICOLARI DELLA PROTEZIONE IGIENICO-TECNICA **

Agrostemin è un'invenzione della dr Danica Gajić. Gli agronomi dei numerosi complessi agricoli/proprietà agricole e gli esperti delle stazioni agricole hanno dato il contributo immenso alla ricerca e alla conferma delle sue caratteristiche con le loro osservazioni e con i risultati-relazioni concrete. Come un prodotto particolare (non è concime, non è pesticida, non è fitormone) dalla vasta gamma di effetti, in base alle ricerche, analisi e verifiche da parte delle istituzioni scientifiche ed esperti eminenti e agli effetti comprovati nella prassi, durante trent'anni di applicazione in agricoltura della Jugoslavia, **AGROSTEMIN®** fa parte dei provvedimenti agro-tecnici standard, come **prodotto per aumento e miglioramento di qualità****.

AGROSTEMIN® viene prodotto secondo il documento del brevetto n. 32749 dell'Istituto federale per i brevetti della SFRJ. Prendendo in considerazione che attualmente sul mercato esistono anche i prodotti falsi, con il controllo della qualità abbiamo assicurato il diritto ad apporre la firma (*Dr. Danica Gajić*) dell'autore-inventore di Agrostemin dr Danica Gajić sulle nostre confezioni e confermare con questo la loro originalità.

*) Decisione n. 3/2-08-9291/02 dell'13 gennaio 2003 Segretariato federale di lavoro, sanità e previdenza sociale

**) Decisione n. 321-01-01175/2009-11 dell' 8 febbraio 2010 Ministero di agricoltura, silvicoltura e della gestione delle acque della Repubblica di Serbia