

**EFFECTOS DEL USO FOLIAR DE AGROSTEMIN<sup>®</sup>  
EN LA BERENJENA BLANCA  
(*Solanum melongena*)**

– experimento de producción –



\* **AGROSTEMIN**® se aplicó filiar, 5 días después del trasplante




SISTEMA DE RAÍCES

NO TRATADAS

TRATADAS\*


\* **AGROSTEMIN**<sup>®</sup> se aplicó foliar, 5 días después del trasplante





\* AGROSTEMIN® se aplicó filiar, 5 días después del trasplante

\* **AGROSTEMIN**® se aplicó foliar, 5 días después del trasplante





**NO TRATADAS**

**TRATADAS\***

\* **AGROSTEMIN**<sup>®</sup> se aplicó filiar,  
5 días después del trasplante

## ALTURA DE LA PLANTA



**NO TRATADAS**



**TRATADAS\***

## LA COMPARACIÓN DE LA ALTURA LEI



\* **AGROSTEMIN**<sup>®</sup> se aplicó filiar, 5 días después del trasplante



## OBSERVACIONES FENOLÓGICAS

NO TRATADAS

TRATADAS\*




\* AGROSTEMIN® se aplicó foliar, 5 días después del trasplante

NO TRATADAS

TRATADAS\*



\* AGROSTEMIN® se aplicó foliar, 5 días después del trasplante



**AGROSTEMIN**<sup>®</sup>



*Dr. Danilo Gajić*

**[www.agrostemin.com](http://www.agrostemin.com)**