


EFEKTI PRIMENE AGROSTEMIN®-a NA PRINOS KROMPIRA
(*Solanum tuberosum*)



Uzorkovanje pred početak "vađenja" krtola



Ocena prinosa po "kućici"




REZULTATI

Varianta	Tretirano	Broj			Masa (kg)	Povećanje prinosa
		stabljika	krtola	"škart"		
T1	"u brazde"	7	22	0	1,865	52,2 %
T2	"u brazde" + folijarno	12	26	0	1,945	58,8 %
T3	folijarno	7	25	1	1,885	53,9 %
K	Kontrola	7	25	2	1,225	/

ZAKLJUČAK

Kod svih varijanti u kojima je primenjen i **AGROSTEMIN®** (**T1**, **T2** i **T3**) konstatovano je značajno povećanje prinosa (**52%** i **58%**), u odnosu na prinos kontrolne varijante.

Varijanta **T2**, kod koje je bilo dva tretmana (30g/ha prskanjem "u brazde" i 30g/ha prskanjem preko lista – folijarno), pokazala se kao superiorna u svakom pogledu; ukupan broj stabljika po "kućici" veći je za 71,0%; broj krtala po "kućici" bio je za 4% veći a na nivou mase ukupanog prinosa dobijeno je **više 58%** – u odnosu na kontrolnu varijantu (**K**).



AGROSTEMIN[®]



Dr. Danilo Gajić

www.agrostemin.com