

# AGROSTEMIN



PÊCHES

NECTARINE

*Dr. Danica Gajić*

ABRICOT

**UTILISATION:** deux fois au cours de la saison

- première fois avant la floraison 30 g/ha "profi" ou 300 g/ha "vert"
- seconde fois après la floraison 30 g/ha "profi" ou 300 g/ha "vert"

Formule		Dosage		Remarque
nom	indication	quand	combien	comment
poudre	WP	avant la floraison – première fois –	2 fois par 30 g "profi" ou 300 g "vert" dissous dans l'eau par hectare de verger	diluer 300 g "vert" dans 4 à 5 l ou 30 g "profi" dans 1,5 à 2 l d'eau tiède, réparti en le nombre d'arroseurs pour couvrir la surface d'un hectare de fruits
		après la floraison – seconde fois –		

## Recommandation:

- ❖ s'il y a un intérêt économique, pulvériser même avant l'apparition de la couleur
- ❖ dans les autres périodes, appliquer au même temps que les autres produits de protection en pulvérisant 150 g/ha "vert" (ou 15 g/ha "profi") pour une meilleure récupération

plus grande surface  
de feuilles avec  
plus de chlorophylle

floraison plus luxuriante  
et meilleure fructification

couleur variétale  
plus prononcée de deux  
ou trois teintes

rendement plus élevé de 5 à 14%

augmentation  
de la teneur en sucre  
et matière sèche

système racinaire  
plus long et plus  
ramifié

résistance est améliorée  
au climat, aux parasites  
et aux maladies

plus apte au transport et au stockage

plus grande  
représentation des récoltes  
de catégorie I

meilleure qualité  
d'échange de matières  
(nutrition)

IL EST TOTALEMENT INOFFENSIF POUR LES HUMAINS, LES ANIMAUX (y compris pour les abeilles) ET L'ENVIRONNEMENT;  
NE NÉCESSITE PAS DE MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION TECHNIQUES ET HYGIÉNIQUES\*)

Ministère de l'Agriculture et des Forêts de la République de Serbie  
Notification n° 321-01-02214/2019-11 du 10.02.2020

\*) Notification n° 3/2-08-9291/02 du 13.01.2003. Secrétariat fédéral du travail, la santé et la protection sociale

